



Que está involucrado en el Diagnóstico y Tratamiento del FASD?

Marco para el Diagnóstico y Tratamiento del SAF

Evaluación Integral

- **Examen físico** para detectar anomalías en la estructura corporal o en el desarrollo del crecimiento.
- **Estado médico** para documentar la circunferencia de la cabeza, la altura, el peso, etc., así como para abordar problemas médicos menores asociados
- **Evaluación del desarrollo neurológico** para incluir el coeficiente intelectual, el rendimiento, el motor visual, la atención, el comportamiento adaptativo y el desarrollo socioemocional.
- **Evaluación familiar** para evaluar la necesidad de tener apoyo comunitario o referirlo a agencias externas.
- **Evaluación educativa** para asegurar la ubicación educativa más apropiada y menos restrictiva.
- **Terapia ocupacional / física / del habla** para abordar las dificultades en las habilidades motoras y el desarrollo del lenguaje.

Tratamiento Enfocado

- **Identificar problemas** basados en una evaluación integral.
- **Recomendar tratamientos específicos** que incluyan intervenciones médicas, psicológicas y educativas.
- **Coordinar los esfuerzos** para asegurar la continuidad de la atención, así como para maximizar las posibilidades de resultados exitosos.

Diagnóstico y Referidos

- **Si la exposición al alcohol** se confirma o se sospecha, esta información sería suficiente para referir a un niño a alguna organización

El Centro para el Abuso de Sustancias Maternas y el Desarrollo del Niño

Clínica Emory de Neurodesarrollo

Brinda diagnóstico diferencial y evaluación

para los efectos de esa exposición.

Para una evaluación, llame al número de Teléfono

404-712-9810

Website: msacd.emory.edu

MotherToBaby Georgia

Provee información gratuita sobre medicamentos

y otras exposiciones durante el embarazo y la lactancia.

Website: www.mothersbabyga.org

Email: mothersbaby@emory.edu

Phone: 855.789.6222


Conozca datos del FASD

Problemas comunes en los niños afectados por el alcohol

- **Problemas médicos menores**, como infecciones de oído, alergias y asma.
- **No avanzar en la infancia**, lo que indica un retraso significativo en el crecimiento que también puede afectar el progreso del desarrollo y el apego.
- **Problemas para alimentarse**, como tener una succión débil o dificultad para agarrar un pezón en la infancia y, posteriormente, disminución del apetito o dificultad para retener la comida.
- **Retrasos en el desarrollo motor durante la infancia**, incluyendo habilidades motoras deficientes, retrasos en las habilidades motoras finas y temblores en las manos.
- **Retrasos en el desarrollo cognitivo**, pero no necesariamente en el rango de deficiencia intelectual.
- **Trastornos específicos del aprendizaje** en edad escolar con mejor desempeño en lectura y lenguaje, menor capacidad en matemáticas
- **Deficiencia intelectual leve** - (CI <70). Inteligencia límite: 70 a 85
- **Trastornos del apego** que causan dificultad para establecer vínculos saludables con los padres o cuidadores
- **Problemas para dormir**, como dificultad para conciliar el sueño y períodos cortos y esporádicos de sueño inquieto
- **Problemas de juicio**, como no aprender de la experiencia o desarrollar un enfoque lógico de los problemas
- **Desregulación de la excitación**, como dificultades con la autorregulación y el control emocional.

Criterios de Diagnóstico para FAS

- **Rasgos faciales inusuales** (ver las fotos a continuación).
 1. Filtrum liso (*la ranura vertical entre el labio superior y la nariz*).
 2. Borde fino bermellón (*el borde entre el labio y la piel normal adyacente*).
 3. Pequeñas fisuras palpebrales (*el espacio entre las esquinas de la abertura del ojo*).
 4. Mandíbula inferior de tamaño insuficiente (Micrognacia)
- **Bajo peso al nacer y talla pequeña** hasta la pubertad, cuando el crecimiento es común.
- **Daños del Sistema nervioso** como cabeza pequeña al nacer (*Microcefalia*), anomalías estructurales del cerebro y problemas neurológicos (i.e. mala coordinación, mal control muscular).



Identificación de Niños con trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (FASDs)